

Gx-MOPS™ PLUS



US

EN: Indication for use

Medium for handling and manipulating oocytes and embryos in ambient atmosphere.

Contraindications

Gx-MOPS™ PLUS contains gentamicin and acetylcysteine. Do not use in patients with known hypersensitivity/allergy to any of the components.

Product Description

SUPPLEMENTED WITH HSA.

Gx-MOPS PLUS is a MOPS buffered medium containing human serum albumin, acetylcysteine, and gentamicin as an antibacterial agent.

Ready to use after equilibration at +37°C and ambient atmosphere.

The summary of safety and clinical performance can be found at [www.vitrolife.com](#)

Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

Gx-MOPS PLUS is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.

Media bottles can be used for up to two weeks after first opening, use aseptic technique and minimize the time outside the refrigerator. Opening of the bottle shall be limited to the time needed to remove the necessary amount of medium. Discard excess media no later than two weeks after first opening.

Directions for use

The product shall be used by an IVF professional. The patient target group is an adult or reproductive-age population that undergoes fertility treatment. Record the opening date on the bottle.

Never place Gx-MOPS PLUS inside a CO₂-incubator or cover it with CO₂-equilibrated oil. Gx-MOPS PLUS can be used for procedures such as handling and collection of cumulus-oocyte complexes, denudation, ICSI, embryo biopsy or other handling procedures at ambient atmosphere.

The volume of Gx-MOPS PLUS used for preparation depends on the procedure according to laboratory practice.

The pH of Gx-MOPS PLUS is stable in ambient environment. To minimize changes in osmolality, Gx-MOPS PLUS can be covered with oil for ART procedures immediately following preparation. Gx-MOPS PLUS with oil overlay may be used for up to 6 hours after preparation.

If Gx-MOPS PLUS is warmed without oil cover in a non-humidified environment, keep the lid on and use Gx-MOPS PLUS as soon as possible after warming, always within 60 minutes after preparation.

Oocytes or embryos shall not remain in Gx-MOPS PLUS for more than 30 minutes. Immediately following the procedure, transfer oocytes or embryos into the appropriate culture medium, including at least two washing steps to avoid carry-over of MOPS buffer into the medium used for culture.

Specifications

Aseptically filtered

Mouse Embryo Assay, 1-cell [% embryos developed to expanded blastocyst at 96 hours]

Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL]

pH tested

Osmolality tested

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

Precautions

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known tests for hepatitis B surface antigen, hepatitis B and C, and hepatitis E, and gentamicin as quality antibacterial agent.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Symbols glossary

"Medical devices – Symbols to be used in information to be supplied by the manufacturer (ISO 15223-1:2021).

Symbol	Title	Reference and symbol ID
	Consult instructions for use	*Ref no: 5.4.3
	Caution	*Ref no: 5.4.4
	Manu-facturer	*Ref no: 5.1.1
	Date of manufacture	*Ref no: 5.1.3
	Use-by date	*Ref no: 5.1.4
	Batch code	*Ref no: 5.1.5
	Catalogue number	*Ref no: 5.1.6
	Sterilized using aseptic pro-cessing techniques	*Ref no: 5.2.2
	Single sterile barrier system	*Ref no: 5.2.11
	Keep away from light source	*Ref no: 5.3.2
	Temperature limit	*Ref no: 5.3.7
	Contains human blood or plasma derivatives	*Ref no: 5.4.6
	Contains a medicinal substance	*Ref no: 5.4.7
	Medical Device	*Ref no: 5.7.7
	CE Mark (Conformité Européen)	European conformity (CE) mark with Notified Body identification number as defined in Regulation (EU) 2017/745 Annex IV

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

CHINA

ZH: 卵母细胞及胚胎操作液 Gx-MOPS™ PLUS产品说明书

产品名称: 卵母细胞及胚胎操作液

适用范围

适用于在大气环境下对卵母细胞和胚胎的操作和培育。

型号: Gx-MOPS™ PLUS, 10173

规格: 1x125 mL

医疗器械注册证: 国械注进XXXXXXXXXX 产品技术要求编号: 国械注安XXXXXXXXXX

禁忌症

Gx-MOPS™ PLUS含有庆大霉素和乙基半胱氨酸, 请勿在已知对该成分敏感/过敏的患者中使用。

产品描述

添加 HSA。Gx-MOPS PLUS 是一种含有人血清白蛋白、乙基半胱氨酸和庆大霉素的大容量 MOPS 缓冲液的培养液。

在 +37°C 的大气环境中平衡后即可使用。

安全性和临床疗效数据可在 [www.vitrolife.com](#) 找到

储存条件和稳定性

产品有效期从生产日期起 36 周为有效期。

避光储存于 +2 至 +8 °C。运输过程中温度可超过 +8 °C，但不得超过 +12 °C，且最终使用时间不得超过 2 天。

在安全的大气环境中平衡后即可使用。

培养基瓶在首次打开后最多可使用两周，使用无菌技术并尽量减少空气暴露的时间。瓶子打开后应限制用于尽可能少的培养步骤。

如果在不加热的环境中加热没有盖油的 Gx-MOPS PLUS，请务必小心盖子并在加热后尽快使用。

Gx-MOPS PLUS，即经灭菌后在 60 分钟内使用。

卵母细胞及胚胎操作液 Gx-MOPS PLUS 的保质期不得超过 36 周。程序完成后，请立即将卵母细胞或胚胎转移至适当的培养液中，包括至少两次的清洗步骤，以避免将 MOPS 缓冲液冲入培养体系。

规范

符合标准: 1-细胞 [96 小时胚胎发育至 4 细胞] % ≥ 80

细菌内毒素 (LAL 检测) [EU/mL] < 0.25

pH 测试

经灭菌测试

每个批号的完整分析报告随货提供。

注意事项

如果基质的完整性受损，丢弃产品。如果发现污染，丢弃。

卵母细胞及胚胎操作液 Gx-MOPS™ PLUS

Media bottles can be used for up to two weeks after first opening, use aseptic technique and minimize the time outside the refrigerator. Opening of the bottle shall be limited to the time needed to remove the necessary amount of medium. Discard excess media no later than two weeks after first opening.

Directions for use

The product shall be used by an IVF professional. The patient target group is an adult or reproductive-age population that undergoes fertility treatment. Record the opening date on the bottle.

Never place Gx-MOPS PLUS inside a CO₂-incubator or cover it with CO₂-equilibrated oil. Gx-MOPS PLUS can be used for procedures such as handling and collection of cumulus-oocyte complexes, denudation, ICSI, embryo biopsy or other handling procedures at ambient atmosphere.

The volume of Gx-MOPS PLUS used for preparation depends on the procedure according to laboratory practice.

The pH of Gx-MOPS PLUS is stable in ambient environment. To minimize changes in osmolality, Gx-MOPS PLUS can be covered with oil for ART procedures immediately following preparation. Gx-MOPS PLUS with oil overlay may be used for up to 6 hours after preparation.

If Gx-MOPS PLUS is warmed without oil cover in a non-humidified environment, keep the lid on and use Gx-MOPS PLUS as soon as possible after warming, always within 60 minutes after preparation.

Oocytes or embryos shall not remain in Gx-MOPS PLUS for more than 30 minutes. Immediately following the procedure, transfer oocytes or embryos into the appropriate culture medium, including at least two washing steps to avoid carry-over of MOPS buffer into the medium used for culture.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Discard the product according to standard clinical practice for medical hazardous waste when the procedure is finished.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner trained in its use. (Rx only).

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use Gx-MOPS PLUS if it appears cloudy.

Gx-MOPS PLUS contains human serum albumin. Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Use only aseptic technique. To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

Verfahren mit Öl überschichtet werden. Gx-MOPS PLUS mit Ölüberschichtung kann bis zu 6 Stunden nach der Vorbereitung verwendet werden.

Wenn Gx-MOPS PLUS in einer nicht befeuchteten Umgebung ohne Ölüberschichtung erwärmt wird, muss der Deckel geschlossen bleiben und Gx-MOPS PLUS so schnell wie möglich nach dem Erwärmen verwendet werden, und zwar immer innerhalb von 60 Minuten nach der Vorbereitung.

Eizellen oder Embryonen dürfen nicht mehr als 30 Minuten in Gx-MOPS PLUS verbleiben. Unmittelbar nach dem Eingriff sollte die Eizelle oder der Embryo in das entsprechende Kulturmedium zu übertragen, wobei mindestens zwei Waschschritte vorzunehmen sind, damit eine Übertragung des MOPS-Puffers in das für Kultivierung verwendete Medium vermieden wird.

Produktdaten

Asepsis filtriert

Maus-Embryo-Assay, einzellig [% Embryonen entwickeln sich nach 96 Stunden zu einer expandierten Blastozyste]

Bakterielle Endotoxine (LAL-Test) [EU/mL]

pH getestet

Osmolalität getestet

Chargen-spezifische Testergebnisse finden Sie auf dem Analyse-zertifikat, das jeder Lieferung beiliegt.

Vorsichtsmaßnahmen

Das Produkt entsorgen, wenn die Flasche beschädigt ist oder wenn das Produkt verdorben wird. Entsorgung des Produkts: Das Produkt nicht verwenden, wenn es trübe erscheint.

Gx-MOPS PLUS enthält humanes Serum-Albumin. Vorsicht! Alle Blutprodukte sind grundsätzlich als potenziell infektiös anzusehen. Das Quellmaterial, von dem dieses Produkt abgeleitet wurde, ist nicht auf HIV-, HBc-, HCV- und HTLV-I/II-Antikörper getestet und ist nicht reaktiv auf HbsAg, HCV RNA und HIV-1 RNA sowie auf Syphilis. Keine derzeit bekannten Testverfahren sind in der Lage, sicherzustellen, dass das Blut gewonnene Produkte keine Infektionserreger übertragen.

Von Verunreinigungen zu verhindern, dürfen die Medienbehälter nur unter Anwendung aseptischer Techniken geöffnet und verwendet werden.

Das Toxizitätsrisiko, das IVF-Medien (inklusive der IVF-Medien von Vitrolife) für die Reproduktion und Entwicklung darstellen, wurde nicht ermittelt und ist unbekannt.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit dem Gerät ereignet hat, sollte dem Hersteller mitgeteilt werden. Bei einem Vorfall des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

Nicht zur Injektion bestimmt.

Nach Abschluss des Verfahrens das Produkt gemäß der üblichen klinischen Praxis für gefährliche medizinische Abfälle entsorgen.

Hinweis: Die US-amerikanische Gesetzgebung beschränkt den Kauf dieses Geräts auf Ärzte, von solchen beauftragte Personen oder in seine Nutzung eingesetzte Fachleute (Rx only).

E: Ενδείξεις χρήσης

Ρυθμιστικό μέσο για την επένδυση και τον χειρισμό οωκυττάρων και εμβρυίων σε στειρωσικούς σωλήνες.

Αντενδείξεις

Το Gx-MOPS™ PLUS πρέπει να χρησιμοποιείται με αστυχαιότητα. Μη χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με γνωστή υπερευαίσθησια/αλλεργία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Παραγραφή προϊόντος

ΕΜΠΛΩΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΗΣΑ.

Το Gx-MOPS PLUS είναι ένα ρυθμιστικό μέσο MOPS που περιέχει ανθρακική αλβουμίνη ορού, αστυχαιότητα και γενοτοξική αντιαρνητική παρα

Oprez: Sa svoj proizvodima dobivenih iz krvi bez testiranja postali kao za potencijalno zarazi. Rezultati analize plazmah materijala z kojih je ovaj proizvod dobiven bili su negativni na protutela na HIV, HbC, HCV1 iHTLV III i ne reaktivni na HbsAg, HCV RnK te HIV-1 RnK i sifilis. Nijedna poznata metoda testiranja ne daje jamstvo da proizvodi dobiveni iz ljudske krvi neće prenijeti zarazu agensa. Za izbjegavanje kontaminacije krvik Vitrofile izključito preporučuje obrvanje i uporabu medija isključno uporabom aseptične tehnike.

Rizik od reproduktivne toksičnosti i razvojne toksičnosti za medije za in vitro oplodnju, uključujući i medije za in vitro oplodnju tribo Vitrofile, nije utvrđen te se ne smatra vjerojatnim.

Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s uređajem treba prijaviti prodavatelju i nadležnom tijelu zdrav čance u kojoj korisnik ili pacijent imo nastan.

Nije za uzdržavanje.

Kada je postupak dovršen, zbrinite proizvod u skladu sa standardnim kliničkom praksom za rukovanje opremim medicinskim oporom.

Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja liječnicima ili obućbenim zdravstvenim djelatnicima ili na njihov nalog (Rx only).

HU: Rendeltesék

Használat és emrók legkörü környezetben történő kezeléséhez és manipulálásához használandó tápoldat.

Ellenjavallatok

A Gx-MOPS™ PLUS gentamicin és acetil-cisztint tartalmaz. Nem alkalmazható az ösztetovetke ismert módon allergiás reakciókban/ allergiában szenvedő páciensek esetében.

A termék leírása

HSA-VL KEGÉSZÍTETT.

A G-MOPS PLUS egy G-MOPS-pufferelt tápoldat, amelyet humán szérumból, acetil-cisztinnal és antibakteriális szerként gentamicinnal tartalmaz.

+37°C-on és legkörü környezetben történő alkalmazás után használandó termék.

A biziottság eldöntés és a klinikai teljesítmény összehajlása a www.vitrofile.com webhelyen található.

Tárolására vonatkozó utasítások és stabilitás

Tárolja szobai helyen, +2°C és +8°C közötti hőmérsékleten.

A Gx-MOPS PLUS oldat üveg címékjén és a LOT-specifikus Vízszilgati Bizonylaton feltüntetett lejáratú időpontig stabil marad.

A tápoldatot az azt tartalmazó üveg első kinyitását követően maximum két héty hasznáhnálhatja fel. Alkalmazás aseptikus technikáú, és a lehezt legrovidebb ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

Használati útmutató

A termék IVF-szkemberek által használatra készült.

A páciensek előcsoprtja a meddősejti kezelésében szolgalszó felínt vagy reprodukció koru populáció. Jégezzse fel a kinyitás dátumát az üvegre. Soha ne helyezze a Gx-MOPS PLUS oldatot CO₂-inokubátorba, és ne fedje le CO₂-ekvibráló alatt.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

A Gx-MOPS PLUS oldat alkalmazathoz példái a cumulus sejtekkel körülvett petesejtök kezeléséhez és a lehezt rövid ideig tartása a hűtőszekrényben kívüli. Az üveget csak addig tartsa kinyitva, amíg minden beöle a kívánt mennyiségű tápoldatot. Az első kinyitást követően maximum két hét elteltével dobják ki a megmaradt tápoldatot.

IT: Istruzioni per l'uso

Terrono per il trattamento e la manipolazione di oociti ed embrioni in atmosfera ambiente.

Contraindicazioni

Gx-MOPS™ PLUS contiene gentamicina e acetilcisteina. Non utilizzare in pazienti con ipersensibilità/allergia note ai componenti.

Descrizione del prodotto

Supplementato con HSA (albumina sierica umana). Gx-MOPS PLUS è un terreno tamponato con MOPS contenente albumina sierica umana, acetilcisteina e gentamicina come agente antibatterico.

Pronto all'uso dopo l'equilibratura a +37 °C in atmosfera ambiente.

Il reservoir sulla sicurezza e sulle prestazioni cliniche è disponibile all'indirizzo www.vitrofile.com

Istruzioni per la conservazione e stabilità

Conservare al riparo dalla luce a una temperatura di 2-8 °C.

Gx-MOPS PLUS rimane stabile fino alla data di scadenza riportata sulle etichette dei contenitori o sul Certificato di analisi di ogni Lotto.

Dopo la prima apertura è possibile utilizzare i flaconi di terreno per un periodo di due settimane. Utilizzare una tecnica asettica e ridurre al minimo il tempo di permanenza all'esterno del frigorifero. L'apertura del contenitore deve essere limitata al tempo necessario per rimuovere la quantità necessaria di terreno. Smaltire il terreno residuo al massimo due settimane dopo la prima apertura.

Istruzioni per l'uso

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista della fecondazione in vitro.

Il gruppo di pazienti target è costituito da una popolazione adulta o in età riproduttiva che si sottopone a trattamento di fertilità. Smaltire il terreno residuo al massimo due settimane dopo la prima apertura.

Istruzioni per l'uso

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista della fecondazione in vitro.

Il gruppo di pazienti target è costituito da una popolazione adulta o in età riproduttiva che si sottopone a trattamento di fertilità. Smaltire il terreno residuo al massimo due settimane dopo la prima apertura.

Istruzioni per l'uso

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista della fecondazione in vitro.

Il gruppo di pazienti target è costituito da una popolazione adulta o in età riproduttiva che si sottopone a trattamento di fertilità. Smaltire il terreno residuo al massimo due settimane dopo la prima apertura.

Istruzioni per l'uso

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista della fecondazione in vitro.

Il gruppo di pazienti target è costituito da una popolazione adulta o in età riproduttiva che si sottopone a trattamento di fertilità. Smaltire il terreno residuo al massimo due settimane dopo la prima apertura.

Istruzioni per l'uso

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista della fecondazione in vitro.

Sammdrag af sikkerheds- og kliniske egenskaper finnes på www.vitrofile.com

Anvisninger for opbevaring og stabilitet

Lagres mørkt ved +2 til +8 °C.

Gx-MOPS PLUS er stabil i et åbent udsatteåben angitt på etiketten på flasken og på det LOT-specifikke analysesertifikat.

Medfasker kan benyttes i oppitt u løper etter åpning. Bruk aseptisk teknik, og gjer tiden utenfor kjøleskap så kort som mulig. Åpen flaske skal berges til den tiden som trengs for å fjerne nødvendig mengde medium. Kast resterende/ gjenværende medium senest to uker etter åpning.

Bruksanvisning

Produktet skal brukes av IVF-fagfolk.

Produktgruppen er voksne personer eller personer i reproduktiv alder som gjennomgår fertilitetsbehandling.

Merk flasken med åpningsdatoen. Ikke plasser Gx-MOPS PLUS i en CO₂-inkubator. Ma ikke dekkes med CO₂-stabilitets øl.

Gx-MOPS PLUS kan brukes til prosedyrer som håndtering og overføring av cumulus-oocyt-komplekser, denudering, ICSI, embryocyster eller andre prosedyrer ved romtemperatur.

Volumet av Gx-MOPS PLUS som brukes til preparering, avhenger av prosedyren i samsvar med laboratorieraks.

pH-innvåt i Gx-MOPS PLUS er stabil i 96 timer i CO₂-inkubator. I tillegg er det en indikator for endringer i osmolalitet som Gx-MOPS PLUS dekket med øl for ART-prosedyrer umiddelbart etter preparering. Gx-MOPS PLUS med overfølelses kan brukes i oppitt 6 timer etter preparering.

Hvis Gx-MOPS PLUS venter på uten overfølelses, i et ikke-fukket miljø, må ikke lukket flasen.

Gx-MOPS PLUS må også brukes så snart som mulig etter oppvarming, og alltid innen 60 minutter etter preparering.

Oocytter eller embryoer skal ikke ligge i Gx-MOPS PLUS i mer enn 30 minutter. Umiddelbart etter prosedyren skal oocytter eller embryoer overføres til et egnet dyringsmedium. Vask minst to ganger for å unngå at det overføres MOPS-buffer til mediet som brukes til dyrking.

Spesifikasjoner

Aseptisk filtrert

Test på embryo fra mus, 1-celle [% embryoer overlevende til ekspansjon blastocyst ved 96 timer] ≥ 80

Bakterielle endotoksiner (LAL-test) [EU/ml] < 0,25

pH testet

Osmolalitet testet

LOT-specifikke testresultater er tilgjenglig på analysesertifikatet som er inkludert i hver leveranse.

Forholdsregler

Kast produktet hvis forsøelingen på flasken er brutt. Ikke bruk Gx-MOPS PLUS dersom det er blakkett.

Gx-MOPS PLUS inneholder humant serumalbumin.

Forsiktig! Alle blodprodukter bør behandles som potensielt smittet. Kildematerialet som tester plukket stammer fra, viste nepstetikkum ved testing for antistoffer mot HIV, HbC, HCV og HTLV I/II, og ikke-reaktivt mot HIV, HbC, HCV og HTLV I/II, og ikke-reaktivt mot HIV, HbC, HCV RNA og HIV-1 RNA og syfilis. Det finnes ingen kjente testmetoder for å teste for antistoffer mot HIV, HbC, HCV og HTLV I/II, og ikke-reaktivt mot HIV, HbC, HCV RNA og HIV-1 RNA og syfilis. Det finnes ingen kjente testmetoder for å teste for antistoffer mot HIV, HbC, HCV og HTLV I/II, og ikke-reaktivt mot HIV, HbC, HCV RNA og HIV-1 RNA og syfilis.

For å unngå kontaminering anbefaler Vitrofile at medier åpnes og brukes utelukkende med aseptisk teknik.

Risikoen for reproduksjons- og utviklingsstokstet for IVF-metoder, inkludert IVF-metoder fra Vitrofile, har ikke blitt fastslått og er usikkert.

Avslørte hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og ansvarlig myndighet i landet den brukes og/eller landet der pasienten befinner seg.

Så ikke innjeres.

Kasser produktet i samsvar med klinikkens rutiner avhengig av farlig medisinisk avfall når prosedyren er fullført.

Forsiktig! Federale lover (USA) begrenser direkte utstyrt til salg fra lege eller etter forordning av lege, eller i og som jobb i laboratorum og er opplært i (Rx only).

nl: Gebruiksaanwijzing

Medium voor het collecteren en manipuleren van eicellen en embryo's aan de lucht.

Contra-indicaties

Gx-MOPS™ PLUS bevat gentamicine en acetylcysteïne. Niet gebruiken bij patiënten met bekende overgevoeligheidsallergie voor een van de componenten.

Productbeschrijving

GESUPLEMENTEERD MET HSA.

Gx-MOPS PLUS is een MOPS gebufferd medium met humaan serumalbumine en acetylcysteïne en gentamicine als een antibacterieel middel.

Gereed voor gebruik na equilibratie op +37°C aan de lucht.

De samenvatting in verband met veiligheid en klinische prestaties kan u vinden op www.vitrofile.com.

Bewaringsvoorschriften en stabiliteit

Donker bewaren bij +2 tot +8 °C.

Gx-MOPS PLUS is stabiel tot de vervaldatum, die vermeld staat op elke fles en op het LOT-specifieke analysesertificaat (CoA).

Geopende flessen kunnen tot twee weken na opening gebruikt worden. Werk steriel en beperk de tijd buiten de koelkast. Het openhouden van de fles moet beperkt worden tot de tijd die nodig is om de benodigde hoeveelheid medium uit de fles te halen.

Het resterende medium moet uiterlijk 2 weken na de eerste keer openen worden weggegooid.

Aanwijzingen voor gebruik

Het product moet gebruikt worden door een IVF-professionaal.

De patiëntendoeelgroep betreft volwassenen of personen op reproductieve leeftijd die een vruchtbaarheidstoestand ervaart.

Noteer de datum van opening op de fles.

Plaats Gx-MOPS PLUS nooit in CO₂-inkubator en bedek het nooit met CO₂-geëquilibreerde olie.

Gx-MOPS PLUS kan worden gebruikt voor procedures zoals het hanteren en verzamelen van cumulus-ei-celcomplexen, denudatie, ICSI, embryocyste of andere behandelingsprocedures aan de lucht.

Het volume Gx-MOPS PLUS dat voor de bereiding wordt gebruikt, is afhankelijk van de procedure en volgens standaard laboratorium procedures.

De pH van Gx-MOPS PLUS is stabiel aan de lucht. Om veranderingen in osmolaliteit tot een minimum te beperken, kan Gx-MOPS PLUS onmiddellijk na de bereiding worden bedekt met olie voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreffend worden met een olie laag bedekt. Gx-MOPS PLUS kan niet worden gebruikt voor ART-procedures. Gx-MOPS PLUS bedekt met een olie laag kan tot 6 uur na de bereiding worden gebruikt.

Als Gx-MOPS PLUS wordt opgewarmd zonder olie laag is een niet-bevochtigde omgeving, moet het deksel desbetreff